

PL **Occusept:**

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Ulotkę należy zachować, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Wskazania: Occusept to wyrób medyczny, przeznaczony do wspomagającego leczenia chorób oczu, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zaburzeń produkcji łez o różnicowanej etiologii, zespołu suchego oka o źródłowanej etiologii, wynikającego z przyjmowania niektórych leków lub niekorzystnych warunków środowiskowych tj. wysoka temperatura, wiatr, itp. Krople Occusept stosowane są do łagodzenia objawów ostrego lub przewlekłego zapalenia spojówek (conjunctivitis) o typie nieinfekcyjnym, przy podrażnieniu oczu wynikającego z niekorzystnych warunków środowiskowych tj. słońce, kurz, dym itp., lub z noszenia soczewek kontaktowych, oraz podczas długotrwałego wyłączenia wzroku. Roztwór można stosować do płukania oczu przy kontakcie z substancjami drażniącymi a także do usuwania ciał obcych.

Skład: Hypromellosum 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras decahydricus 2 mg w 1 ml. Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetat, caprylic/capric triglyceride, polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.

Charakterystyka: Preparat Occusept jest oftalmologikum, krople do oczu. Chodzi o niskolepką roztwór izotoniczny z ekstraktem Euphrasia officinalis (Świętlik lekarski). Używany jest on tradycyjnie przy oftalmii, której towarzyszy zaczerwienienie oraz palenie oczu, przy podwyższonym łzawieniu oczu, przy obrzękach a także przy zaczerwienieniu powiek oraz brzegów powiek. Roztwór zawiera składniki lipidyczne – Lipozoom™, frakcje czyszczonej lecytyny sojowej (phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine), które z natury występują w tłuszczach a poprawiają osłonę oka poprzez film ochronny (wydużają czas, przez który jest film nieprzerwany, ponieważ stwarzają warstwę, która broni odparowywaniu i naruszeniu spójnej warstwy filmu łoża), co w znaczący sposób poprawia komfort pacjenta przy zaburzeniach tworzenia łez.

Wskazania: Preparat Occusept używa się do substytucji łez przy zaburzeniach tworzenia łez oraz do wytwarzania filmu ochronnego przy działaniu nieprzyjaznych warunków zewnętrznych, przy ostrych lub chronicznych oftalmiach, przy podrażnieniu oczu, w przypadku zmęczenia oczu po długoterminowym obciążeniu oraz do płukania oczu.

Przeciwwskazanie: Zbyt duża czułość na działanie jakiegokolwiek substancji podanej w składzie preparatu.

Interakcja: Preparatu nie wolno stosować równocześnie z kroplami do oczu, które zawierają sole metali.

Działania niepożądane: są znane. W przypadku wystąpienia nieporządkanych reakcji należy skontaktować się z lekarzem okulistą.

Dawkowanie i sposób aplikacji wyrobu medycznego: Preparat dawkuje się indywidualnie. Zwykła dawka wynosi 2 aż 3 razy dziennie 1 aż 2 krople do worka spojówkowego. Preparat można używać długotrwale.

INSTRUKCJA UŻYCIA NAKRĘTKI - KROPLOMIERZA:

1. Poprzez pokręcenie nakrętki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie odewrij pasek zabezpieczający.
2. Zdejmij nakrętkę a następnie butelkę obróć dnem do góry.
3. Kończkami palców jednej ręki ściągnij dolne wieczko i poprzez lekkie naciśnięcie drugą ręką na butelkę dawkuj przepisową ilość kropli do oka lub do worka spojówkowego odkrytego ściągnięciem dolnego wieczka.
4. Przy zakraplaniu nie dopuść do kontaktu pipetki z okiem lub naskórkiem i nie dotykaj końcówki pipetki, aby nie doszło do kontaminacji roztworu.
5. Po zastosowaniu nasadź nakrętkę zawsze wstecz i dobrze zamknij.
6. Jeżeli preparat używasz do płukania oka, zawartość butelki przez kilkakrotnie naciśnięcie napełnij wianienkę ozną aż do ryski. Wianienkę przyłóż

do chorego oka, głowę odchyl tak, aby oko było zanurzone do cieczy. Okiem poruszaj tak, aby doszło do zwilżenia całej powierzchni gałki ocznej. Zalecany czas płukania wynosi od 2 do 5 minut.

7. Jeżeli używasz soczewki kontaktowe, a nastąpi zapalenie lub podrażnienie oczu, preparat Occusept aplikuj tylko w przypadku, kiedy soczewki kontaktowe są wyjęte. Soczewki kontaktowe można założyć aż 30 minut po zastosowaniu preparatu.
8. Przy założonych soczewkach kontaktowych preparat Occusept aplikuje się tylko w celu zwilżenia oka.

Preparat Occusept na podstawie dostępnych danych, może być używany przez dzieci, kobiety w ciąży oraz przez kobiety karmiąjące.

Środki ostrożności:

⚠️ Jeżeli używasz inne leki oczne, o możliwości użycia preparatu Occusept zapytaj lekarza okulisty. Jeżeli stan po użyciu preparatu nie poprawi się w terminie do 7 dni lub dojdzie do pogorszenia stanu, skontaktuj się z lekarzem okulistą.

⚠️ Podczas używania kropli do oczu, w przypadku zapalenia i przy podrażnieniu oczu oraz przy wypłukaniu oczu nie mogą być założone miękkie soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe można założyć aż 30 minut po użyciu preparatu.

⚠️ Z zawartości jednej buteleczki powinna korzystać tylko jedna osoba. W ten sposób obniża się niebezpieczeństwo przeniesienia ewentualnej infekcji.

⚠️ Przy przypadkowym spożyciu wyrobu medycznego, należy wypić większą ilość wody oraz skontaktować się z lekarzem.

⚠️ Dzieci młodsze niż 3 lata preparat mogą używać tylko po konsultacji z lekarzem specjalistą.

Przechowywanie: Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknij buteleczkę i przechowuj w pozycji pionowej.



Ostrzeżenie:

⚠️ Jeżeli zauważył jakiegokolwiek niepożądane skutki uboczne, należy skontaktować się z lekarzem.


⚠️ Preparatu nie używaj w przypadku jego zmętnienia lub w przypadku zmiany koloru.

⚠️ Preparatu nie wolno używać po upływie okresu przydatności do użycia, która jest podana na opakowaniu, a to i w przypadku, jeżeli buteleczka nie została otwarta.

⚠️ Po otwarciu buteleczki preparat może być używany tylko przez okres 30 dni.

Opakowanie: Opakowanie preparatu Occusept zawiera 2 x 20 ml roztworu napełnionego w butelce plastikowej z nakrętką. Częścią opakowania jest i wianienka plastikowa do płukania oczu.









Utylizacja: Niezużyty preparat zwróć do apteki. Puste opakowanie wrzuc do odpowiedniego kontenera odpadu segregowanego.

 Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalce, Czechy
Tel.: (+420) 311 230 754, E-mail: phyteneo@phyteneo.cz

 informacja jest podana na opakowaniu



Pojemność: 2 x 20 ml Wersja C-400-192-16-EE-R5 z dnia 21. 2. 2021

 5°C / 25°C	Limit temperatury.		Numar partii
	Chronic przed promieniowaniem słonecznym.		Data ważności.
	Przeczytaj instrukcję użytkowania.		Producător.
	Numar referențijny.		Ostrzeżenie.

RO **Occusept:**

Inainte de utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru eventualitatea unei folosiri ulterioare.

Scopul propus: Occusept este un dispozitiv medical utilizat ca si tratament de sprijin in cazul afectiunilor oculare. Îmbunătățește sistemul de lubrefiere naturală a ochiului în cazul sindromului ochiului uscat de etiologie variată, din cauza utilizării unor medicamente sau condiții externe (temperaturi ridicate, vânt etc.). Aplicarea soluției văscocoelastice asigură umezirea ochiului, duce la înlăturarea unor corpuri străine și calmează ochii în cazul unor inflamații acute sau cronice în cazul conjunctivitei de origine neinfecțioasă, în cazul iritării ochilor datorită factorilor externi (soare, praf, fum etc.) sau din cauza purtării lentilelor de contact ori a efortului vizual pe termen lung. Soluția se poate utiliza pentru clătirea ochilor în cazul atingerii acestora cu substanțe iritante și în urma înlăturării corpurilor străine.

Compoziția: Hypromellosum 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras decahydricus 2 mg în 1 ml. Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetat, caprylic/capric triglyceride, polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.

Caracteristici: Occusept este un preparat oftalmologic sub formă de picături. Este o soluție izotonică cu vâscozitate redusă având conservanți neiritanți- acid boric, diborat de sodiu decahidrat și sulfat de zinc, componente lipidice – fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamine și extract de Euphrasia officinalis. Componentele lipidice fracționate purificate din lecitina de soia, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina există în mod natural în compoziția lacrimilor și îmbunătățesc acoperirea ochiului cu un film protector. (asigură un strat stabil pe suprafața oculară prin formarea unui strat lipidic care previne evaporarea . Îmbunătățește semnificativ confortul pacientului în cazul afecțiunilor de producere a lacrimilor. Euphrasia officinalis (iarba de silur) se utilizează în mod tradițional în cazul afecțiunilor inflamatorii ale conjunctivelor însoțite de înroșirea și arsura ochilor, în cazul lăcrimării excesive, al edemelor, înroșirea ploapei sau a marginii acesteia.

Indicații: Preparatul se utilizează pentru umezirea ochiului în cazul sindromului ochiului uscat, pentru formarea filmului protector în cazul acțiunii condițiilor externe neprielnice, în cazul inflamației acute sau cronice a conjunctivelor, în cazul iritării ochilor, în cazul oboseli în urma efortului vizual pe termen lung și pentru clătirea ochilor.

Contraindicații: Hipersensibilitate la orice substanță menționată în compoziția preparatului.

Interacțiuni: Se interzice utilizarea preparatului simultan cu picăturile de ochi care conțin săruri de metale.

Efecte nedorite: Nu se cunosc. În cazul apariției unor reacții neobișnuite, consultați medicul oftalmolog.

Dozarea și modul de administrare: Preparatul se dozează individual, doza obișnuită este de la 2 până la 3 ori pe zi 1 până la 2 picături în sacul conjunctival. Preparatul se poate utiliza și pe termen lung în funcție de nevoie.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A DOPULUI DE PICURARE:

1. Prin rotirea dopului contra sensului de rotație a acelor de ceasornic, rupeți inelul de siguranță.
2. Dați dopul jos și întoarceți flaconul cu fundul în sus.
3. Cu vârful degetelor unei mâini, trageți pleoapa inferioară și, printr-o apăsare ușoară cu cealaltă mână pe flacon, dozați numărul prescris de picături în ochi sau în sacul conjunctival dezvelit prin tragerea în jos a pleoapei inferioare.
4. În cursul picurării în ochi, împiedicați contactul picurătorului cu ochiul sau epiderma și nu atingeți vârful picurătorului ca să nu se contamineze soluția.
5. După utilizare, puneți întotdeauna dopul înapoi și închideți bine.
6. În cazul în care se utilizează pentru clătirea ochiului, aceasta se realizează fie prin folosirea jetului direct din flacon sau cu ajutorul recipientului atașat. Umpleți recipientul până la semn prin apăsarea de câteva ori a flaconului. Aplicați recipientul pe ochiul afectat , aplecați capul astfel încât ochiul să fie

scufundat în lichid. Mișcați ochiul astfel încât să se irige întreaga suprafață a globului ocular. Durata recomandată a clătirii este de 2-5 minute.

7. În cazul în care utilizați lentile de contact, aplicați preparatul Occusept în cazul inflamațiilor ochilor și al clătirii ochilor, doar dacă lentilele de contact sunt scoase afară. Lentilele de contact pot fi puse la loc abia după 30 de minute după utilizarea preparatului.

8. Cu lentilele de contact puse, preparatul Occusept se aplică doar în scopul umezirii suprafeței ochiului.

Preparatul Occusept, în baza datelor accesibile, se poate utiliza și la copii, femei gravide și femei care alăptează.

Avertizare:

⚠️ În cazul în care utilizați alte picături de ochi, cereți sfatul medicului oftalmolog referitor la posibilitatea administrării simultane cu acest preparat. Dacă în termen de 7 zile starea nu se ameliorează sau chiar se agravează , consultați un medic oftalmolog.

⚠️ Pe perioada utilizării picăturilor de ochi în cazul inflamațiilor sau a iritării ochilor și în cursul clătirii acestora nu se recomanda folosirea lentilelor de contact moi, acestea se pot utiliza la o distanță de 30 de minute de la administrarea picăturilor.

⚠️ Conținutul unui flacon se recomanda a se folosi de către o singură persoană. Astfel se reduce posibilitatea de transmitere a unei eventuale infecții.

⚠️ La o ingerarea accidentală , beți o cantitate mai mare de apă și consultați medicul.

⚠️ Copiii sub vârsta de 3 ani pot utiliza preparatul doar la recomandarea medicului specialist.

Păstrarea: Păstrați departe de accesul copiilor. Depozitați în ambalaj original. După utilizare închideți etanș și depozitați în poziție verticală.

Avertizare:

⚠️ Dacă observați orice efecte adverse, contactați medicul dumneavoastră.


⚠️ Nu utilizați preparatul în cazul în care soluția este tulbură sau și-a schimbat culoarea.

⚠️ Se interzice utilizarea preparatului după expirarea perioadei de valabilitate marcate pe ambalaj, și anume chiar dacă flaconul nu a fost până acum deschis.

⚠️ În urma deschiderii flaconului, preparatul poate fi utilizat doar pe o perioadă de 30 de zile.

Ambalaj: Ambalajul preparatului Occusept conține 2 x 20 ml de soluție umplută în flacon alb de plastic cu dop. Accesoriu preparat – recipient de plastic pentru clătirea ochiului.

Lichidarea: Dispozitivul neconsumat trebuie restituit la farmacie. Materialul de ambalaj curat se lichează în containerul potrivit pentru deșeuri sortate.

 Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalce, Republica Cehă
Tel.: (+420) 311 230 754, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

 datele sunt specificate pe ambalaj



Volum: 2 x 20 ml Versiunea C-400-192-16-EE-R5 din data de 21. 2. 2021

 5°C / 25°C	Limita de temperatura.		Număr șarjă.
	Protejați contra radiațiilor solare.		Date privind expirarea valabilității.
	Fragil, manipulați cu atenție.		Denumirea producătorului.
	Numărul de referință.		Avertizare.

ET Occusept:

Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Sihtotstarve: Occusept on meditsiiniseade, mis on mõeldud inimeste silmahaiguste toetavaks raviks. Parandab silma niisutamist mitmesuguse etioloogiaga, mõnede ravimite tarvitamise või välistingimuste (kõrge temperatuur, tuul jne) mõjul tekkinud kuiva silma sündroomi korral. Viskoelaste lahuse manustamine tagab silma niisutamise, toob kaasa vöörast päritolu ainete eemaldamise ja rahustab silmi ägeda või kroonilise silma sidekesta mitterakkusliku põletiku (konjunktiviidi) korral, silmade ärrituse korral väliste tingimuste (päike, tolm, suits jne) või kontaktläätsede kandmise tõttu ning nägemise pikaajalisel pingutamisel. Lahust võib kasutada silmade loputamiseks ärritavate ainete silma sattumisel ja vöörkehade eemaldamiseks.

Koostis: Hypromellose 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras decahydricus 2 mg 1 ml-s Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetate, caprylic/capric triglyceride polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.

Iselomustus: Occusept on oftalmoloogiline preparaat – silmatilgad. See on väikese viskoossusega isotooniline lahus, mis sisaldab mitteärritavaid säilitusaineid boorhapet, naatriumtetraboraati ja tsinksulfaati, lipiidseid koostisosi fosfatidüülkoliini ja fosfatidüületanolamiini ning hariliku silmarohu ekstrakti. Lipiidseid koostisosi – puhastatud sojaletsitiini fraktsioonid fosfatidüülkoliini ja fosfatidüületanolamiini, mida pisarad naturaalselt sisaldavad, parandavad silma kaetust kaitsekilega (pikendavad aega, mille jooksul on kaitsekile pidev, kuna moodustavad lipiidse kihi, mis takistab pisarakele pideva pinna aurustumist ja lagunemist), tänu millele suureneb märkimisväärselt patsiendi mugavustunne pisaratekke häirete korral. Hariliku silmarohu (Euphrasia officinalis) kasutatakse traditsiooniliselt sidekesta põletikuliste haiguste korral, millega kaasneb silmade punetus ja põletustunne, suurenenud pisaravool, laugude või lauserva paistetuse ja punetuse korral.

Näidustused: Preparaat kasutatakse silma niisutamiseks kuiva silma sündroomi korral, kaitsekile loomiseks ebasoodsate välistingimuste korral, sidekesta ägeda või kroonilise põletik, silmade ärrituse ja nägemise pikaajalise pingutuse põhjustatud väsimuse korral ning silmade loputamiseks.

Vastunäidustused: Ülitundlikkus preparaadi ükskõik millise koostisaine suhtes.

Koostoimed: Preparaat ei tohi kasutada samaaegselt metallisooli sisaldavate silmatilkadega.

Kõrvatoimed: Ei ole teada. Ebatavaliste reaktsioonide tekkimisel pidage nõu silmaarstiga.

Annustamine ja manustamisviis: Preparaat annustatakse individuaalselt, tavaline annus on 2–3 korda päevas 1–2 tilka sidekestakotti. Vajadusel võib preparaati kasutada ka pikaajaliselt.

TILGUTAMISOTSAKU KASUTAMINE:

- Sulguri vastupäeva keeramisega rebige lahti fikseerimisriba.
- Eemaldage sulgur ja pöörake pudeli põhi ülespoole.
- Tõmmake ühe käe sõrmeotstega alumine laug alla ja teise käega kergelt pudelile vajutades annustage ettenähtud arv tilku silma või alumise lau allatõmbamisega paljastatud sidekestakotti.
- Preparaadi silma tilgutamisel vältige tilgutamisotsaku kokkupuutumist silma ja nahaga ning ärge puudutage otsaku ülemist otsa, et vältida lahuse saastumist.
- Pärast kasutamist paigaldage sulgur uuesti ja keerake see korralikult kinni.
- Kui te kasutate preparaati silma loputamiseks, täitke mitu korda vajutades silmavanni kuni kriipsuni pudeli sisuga. Asetage silmavann saastunud

silmale ja kallutage pea taha nii, et silm oleks vedeliku sees. Liigutage silma, et silmamuna kogu pind saaks vedelikuga kokku. Soovitatav loputamise aeg on 2–5 minutit.

- Kui te kannate kontaktlääsi, manustage preparaati Occusept põletike ja silmaärrituse korral ning loputage silmi sellega ainult siis, kui kontaktläätsed on välja võetud. Kontaktläätsed võib uuesti silma panna alles 30 minuti möödumisel preparaadi kasutamisest.
- Kui kontaktläätsed on silmas, manustatakse preparaati Occusept ainult silma pinna niisutamiseks.

Preparaati Occusept võivad kättesaadavate andmete alusel kasutada ka lapsed, rasedad ja imetavad naised.

Tähelepanu:

- ⚠️ Kui te kasutate muid silmaravimeid, pidage samaaegse kasutamise osas nõu silmaarstiga. Kui seisund ei parane 7 päeva jooksul või hoopis halveneb, pöörduge silmaarsti poole.
- ⚠️ Silmatilkade kasutamisel põletike ja silmade ärrituse korral ning silmade loputamisel ei tohi silmas olla pehmed kontaktläätsed. Need võib silma panna alles 30 minuti möödumisel preparaadi kasutamisest.
- ⚠️ Ühe pudeli sisu peaks kasutama ainult üks inimene. See vähendab võimaliku nakkuse levimise ohtu.
- ⚠️ Juhuslikul allaneelamisel jooge peale suurem kogus vett ja pöörduge arsti poole.
- ⚠️ Alla 3-aastased lapsed võivad preparaati kasutada ainult pärast eriarstiga nõu pidamist.

Säilitamine: Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Säilitage originaalpakendis. Pärast kasutamist sulgege tihedalt ja hoidke vertikaalasendis.

Hoiatused:

- ⚠️ Kui te märkate mis tahes kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti poole.
- ⚠️ Ärge kasutage preparaati, mis on läinud häguseks või mille toon on muutunud.
- ⚠️ Preparaat ei tohi pärast pakendile kantud kõlblikkusaja möödumist kasutada ka siis, kui pudelit ei ole veel avatud.
- ⚠️ Pärast pudeli avamist võib preparaati kasutada ainult 30 päeva.

Pakend: Preparaadil Occusept pakend sisaldab 2 x 20 ml lahust, mis on villitud valgesse sulguriga plastikpudelisse. Preparaadiga on kaasas ka plastikvann silma loputamiseks.

Likvideerimine: Kasutamata jäänud preparaat viige tagasi apteeki. Puhas pakkematerjal visake vastavasse sortitud jäätmete konteinerisse.

Neofyt Ltd., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Tšehhi Vabariik
Tel.: (+420) 311 230 754, E-post: phyteneo@phyteneo.cz

Andmeid vt pakendilt

Volume: 2 x 20 ml C-400-192-16-EE-R5, 21. 2. 2021

5°C – 25°C	Temperatuur piir.	LOT	Partii number.
	Kaitsta päikesekiirguse eest.		Andmed kõlblikkusaja kohta.
	Lugege kasutusjuhendit.		Tootja.
REF	Viitenumber.		Hoiatus.

EN Occusept:

Read the Instructions for Use carefully before using. Keep the Instructions for Use in case you need to read them again.

Intended Purpose: Occusept is a medical device for the supportive treatment of human eye diseases. It moisturizes eyes and helps to alleviate dry eye syndrome which is often caused by environmental conditions (heat, wind, etc.) or as a side effect of certain medications. Occusept is a viscoelastic solution applied in eyes for foreign object removal and for improved moistening. It also soothes eyes during non-infectious acute or chronic conjunctivitis, calms irritation caused by environmental conditions (sun, dust, smoke, etc.) or by wearing contact lenses, and reduces long-term eye strain. Use the solution to rinse your eyes after a contact with irritants and for foreign object removal.

Composition: Hypromellose 5 mg, boric acid 8.5 mg, sodium tetraborate decahydrate 2 mg in 1 ml. Purified water, Euphrasia officinalis fluid extract, sodium chloride, zinc sulfate heptahydrate, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, α-tocopheryl acetate, caprylic/capric triglyceride, polysorbate 80, ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, sodium hydroxide.

Characteristics: Occusept, ophthalmic eye drops, is a low-viscosity isotonic solution containing non-irritating preservatives; boric acid, sodium tetraborate and zinc sulfate. Further it contains lipidic compounds phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and extract of Euphrasia officinalis. Purified soy lecithin fractions, phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine, occur naturally in tears forming a protective eye film. This lipid layer prevents moisture evaporation and helps to maintain uninterrupted and continuous tear film. This significantly improves the comfort of patients with tear production disorders. Traditionally, Euphrasia officinalis is used to treat redness and burning eyes caused by conjunctivitis, then, excessive tear production, swelling and red eyelids or eyelid margins.

Indication: The product is used for eye moistening, especially for the dry eye syndrome; further it is used to create a protective tear film during an exposure to unfavourable environmental conditions, for acute or chronic conjunctivitis, eye irritation, fatigue following a long period of eye strain and to rinse the eyes.

Contraindications: Hypersensitivity to any of the compounds stated in the product's composition.

Interactions: The product cannot be used together with eye drops containing metallic salts.

Adverse effects: Unknown. In the case of any unusual reactions to the product, consult your eye specialist.

Dosage and application: Apply the product individually. The usual dose is 2 to 3 times per day. For each dose apply 1 to 2 drops into the conjunctiva. The product can also be used long-term, as needed.

INSTRUCTIONS FOR USING THE DROPPER:

- Turn the cap counterclockwise to tear off the security strip.
- Remove the cap and turn the bottle upside down.
- Using the fingertips of one hand, pull the lower eyelid down and using the other hand, lightly press the prescribed number of drops into the eye or conjunctiva, which is revealed once pulling the lower eyelid down.
- To avoid contamination during application, prevent the eye dropper from direct contact with the eye or the skin and do not touch the tip of the eye dropper.
- After use, always put the cap back on and close tightly.
- To rinse the eye, either apply the direct flow from the dropper to the eye or press the bottle several times until you fill the enclosed eye cup up to

its mark line. Apply the eye cup to the affected eye, then tilt your head so that the eye is submerged in the liquid. Move the eye from side to side to rinse the entire surface of the eyeball. The recommended time for rinsing using the cup is 2-5 minutes.

- Contact lenses must be removed prior to using Occusept only in the case of eye rinsing or when treating eye inflammation and irritation. Contact lenses can be put back in 30 minutes after using the product.
- Wearing contact lenses does not affect the use of Occusept for eye moistening purposes.

According to the information available, Occusept can also be used by children, pregnant and nursing women.

Caution:

- ⚠️ If you are using other eye medication, consult your eye specialist regarding the suitability of parallel use. If your condition does not improve within 7 days or even if it worsens, consult your eye specialist.
- ⚠️ Soft contact lenses should not be worn during ongoing eye inflammation or irritation, or during the procedure of eye rinsing. Soft contact lenses can be worn 30 minutes after using the product.
- ⚠️ To reduce the risk of cross contamination and infection transmission, the content of one bottle should only be used by one person.
- ⚠️ If ingested accidentally, drink a larger amount of water and contact your physician.
- ⚠️ Children younger than 3 years of age can use the product only following consultation with a specialist.

Storage: Keep out of reach of children. Keep in its original package. Close tightly after opening and store in a vertical position.

Warning:

- ⚠️ If you notice any adverse effects, consult your physician.
- ⚠️ Do not use the product if its content turned turbid or if it has changed color.
- ⚠️ The product cannot be used after the expiration date stated on the package, not even if the bottle is still sealed.
- ⚠️ Once the bottle has been opened, the product can only be used for a period of 30 days.

Packaging: Product packaging contains 2 x 20 ml of solution in white capped plastic bottles. Product accessories: a small plastic eye cup for rinsing.

Disposal: Return the expired or unused product back to the pharmacy. The package can be recycled in the appropriate recycle bin.

Neofyt Ltd., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Czech Republic
Tel.: (+420) 311 230 754, E-mail: phyteneo@phyteneo.cz

Data is stated on the package

Volume: 2 x 20 ml Version C-400-192-16-EE-R5 from February 21st, 2021

5°C – 25°C	Temperature limit.	LOT	Batch number.
	Protect from sunlight.		Use by date.
	Read Instructions for Use.		Manufacturer.
REF	Catalogue number.		Warning.